




Radyoterapide

Palingen krem



Akut radyodermatit

Nasıl iyileşir?

Palingen krem

radyo-oksidatif stresin neden olduğu cilt bozukluklarını ortadan kaldırır



U.O.C Onkolojik Radyoterapi BÜYÜK METROPOLİTAN HASTANESİ "Bianchi Melacrino Morelli Reggio Calabria" da test edilmiştir

Radyasyon tedavisi

hücreleri yok etmek için iyonlaştırıcı radyasyon kullanan bir tedavidir.

Radyoterapi tedavileri, tümör hücrelerine maksimum zarar verecek ve aynı zamanda çevre sağlıklı dokulara verilen zararı sınırlandıracak şekilde planlanmaktadır.

Topikal düzeyde oluşan yan etkileri en aza indirmeye yönelik teknolojik yeniliklere rağmen, ne yazık ki bunları ortadan kaldırmak mümkün olmamaktadır, örneğin:

Akut radyodermatit
eritematöz lezyonlar, kızarıklık, yanıklar,
tahriş ve şiddetli formlarda kangrenöz
nekroz.



**Raffaella Spagna, Nadine G. Grillone,
Anna Maria Marchione, Carmelo Tuscano, Said Al Sayyad.**

Bu çalışmanın amacı, meme kanseri için radyoterapi alan hastalarda Palingen krem kullanımının akut radyodermatiti nasıl sınırladığını ve kortikosteroid kullanımını nasıl geciktirdiğini doğrulamaktır.

Mart-Eylül 2019 arasında adjuvan radyoterapi uygulanan on hasta seçilmiştir. Çalışmaya kaydedilen hastalar 50 yaşın üzerinde ve tümü patolojik evre T1-T2 N0 olan meme kanseri için konservatif cerrahi geçirmişti.

Palingen ile topikal terapi, kremin ilk günden itibaren ve radyoterapi tedavisinin tüm süresi boyunca memeye günde üç kez uygulanmasını içermektedir.

Cerrahi yaranın konsolidasyon sürecini kolaylaştırmak için bir hastamıza radyasyon tedavisi öncesi krem reçete edildi (Img.1).


Akut dermal toksisite, Pathak kriterlerine göre haftalık olarak değerlendirildi.

Derece 0	Derece 1	Derece 2	Derece 3	Derece 4
Değişim yok	Hafif ve / veya ağrısız eritem, epilasyon, soyulma, kuruluk	Hassas ve / veya yoğun eritem, deskuamasyon, kısmi transidasyon, orta derecede ödem	Deskuamasyon, yaygın eksüdasyon, belirgin ödem	Ülserasyon, kanama, nekroz

Sonuçlar:

Gözlemlediğimiz tüm hastalar, Palingen kremiyle yapılan tedaviden anında fayda gördüklerini belirtmişlerdir.

Katılan 10 hastadan 1 hastada Derece 0 cilt toksisitesi, 8 hastada Derece 1 cilt toksisitesi, 1 hastada Derece 2 cilt toksisitesi, gözlemlenmiştir. Derece 2 deri toksisitesi gösteren hastada Bromelain ilavesiyle müdahale edilmesi uygun görülmüştür.



DERECE 0



DERECE 1



DERECE 2




DERECE 3



DERECE 4



**Resim. 1: Ameliyat sonrası konsolide olmayan cerrahi yara
(5 / Temmuz / 2019)**



**Resim. 2: Palingen kremi ile tedavi sonrası resim
(21 / Ağustos / 2019)**

konsolide olmayan cerrahi yarası olan hastada cerrahi yara iyileşti (Img 2)



Palingen Krem, kızarıklık önleyici ve yatıştırıcı etkisiyle iyileşme ve yeniden epitelizasyon süreçlerini desteklemiştir (Resim 3 - 4)

Kanı:

Verilerimiz, meme kanseri için radyasyon tedavisi gören hastalarda radyodermatit tedavisinde Palingen kreminin kullanılmasını önermektedir.



Bu broşür sadece Praevenio Pharma şirketi için düzenlenmiştir